





ALERTA SARAMPIÓN



DEFINICIÓN

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.



SÍNTOMAS

Los síntomas suelen aparecer 7–14 días después del contagio:

- Fiebre alta
- Tos
- Secreción nasal
- Ojos rojos o conjuntivitis
- Manchas rojas en la piel (erupción que inicia en la cara y se extiende al cuerpo)



PREVENCIÓN

La forma más efectiva de prevenir el sarampión es la vacunación con la vacuna triple viral.

- Verificar el esquema de vacunación.
- Lavado frecuente de manos.
- Cubrirse al toser o estornudar.
- Evitar asistir a la Universidad si se presentan síntomas.



¿QUÉ HACER ANTE UN CASO SOSPECHOSO?

1. Evitar contacto cercano con otras personas.
2. Consultar a un profesional de salud, no automedicarse.
3. Si sospecha haber tenido contacto directo con personas infectadas, vigile los síntomas 7 a 14 días posteriores.




VACUNACIÓN

La protección se logra con la vacuna triple viral. Esta vacuna hace parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y es gratuita en el país.

Puede vacunarse en:

- Centros de salud públicos
- Puntos de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
- Jornadas de vacunación organizadas por las Secretarías de Salud



Se recomienda a toda la comunidad Universitaria que:

- Verifique su carné de vacunación.
- Confirme que tienen dos dosis de la vacuna triple viral.
- Acuda al centro de salud más cercano si no recuerdan su esquema de vacunación.



BIBLIOGRAFÍA

https://www.msmanuals.com/es/professional/pediatr%C3%ADa/infecciones-virales-comunes-en-lactantes-ni%C3%B1os/sarampi%C3%B3n#Diagn%C3%B3stico_v101587140_es
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles>